

Abebrødtræ

(*Adansonia digitata*)

6 frø

Værd at vide:

Abebrødtræet - også kaldet Afrikansk Baobab - hører til de mest markante planter. Det besidder en uregelmæssig og over dimensioneret stamme (til lagring af vand) af meget blødt træ. Det smider sine blad i tørkeperioden for at beskytte sig mod tørkens dræbende effekt.

Oprindelse:

Denne *Adansonia* har sin oprindelse på Østafrikas savanne.

Formering:

Såning og spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Før sånings skal frøene ligge i blød i rumvarmt vand i 24 timer. Derefter sættes frøene, med god afstand, i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Såjorden holdes fugtig, men ikke våd. De første frø spirer først efter 3 til 7 uger med en varm placering med en temperatur på mellem 23° til 27° C (f.eks i et opvarmet mini væksthus). Efter de første kimblade har vist sig sker der faktisk intet over jordoverfladen, da træet først og fremmest udvikler rodnettet. Når frøplanterne efter 2 til 3 måneder skal prikles (omplantes) skal vækstmediet bestå af 2 dele jord, 1 del ler og 1 del sand.

Placering / lys:

Baobaben tåler brændende sol og elsker lyse og varme placeringer.

Gødning, vanding og pleje:

Unge planter skal vandes hyppigere og med plantens stigende alder skal den have længere og længere tørkeperioder. Det bløde træ har til opgave at lagre vand. Gødning tilføres hver 4. til hver 6. uge. Træet smider også løvet - dette kan tidsmæssigt være ret forskelligt. Løvfaldet hænger sammen med den rytme tørkeperioderne indtræffer. Ved løvfald er det bedst at standse gødningstildelingen.

Overvintring:

Træet skal stå lyst og ved en temperatur på ikke under 15° C. Hver 4. uge gives en lille smule vand, så de fine rødder lige netop ikke udtørre, da dette vil føre til hæmning af væksten den følgende forår.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

