

Engletrompet (hvid)

(*Burgmansia suaveolens*)

10 frø

Advarsel: Plante og frø er giftige! Lad ikke børn komme i nærheden.

Værd at vide:

Denne Engletrompet med dens kæmpe, 30 cm lange, hvide blomsterhører til de stærkest voksende arter, da den tidligt forgrener sig og kan blive op til 3,5 meter høj.

Oprindelse:

Oprindeligt er den hjemmehørende i Sydbrasilien. Idag findes planten mange steder i Sydamerika, Caribien og tropisk Afrika.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt fra februar til september. Sæt frøene i blød i rumvarmt vand i 12 timer og derefter sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved ca. 20° C følger spiringen efter 2 til 4 uger.

Placering / lys:

Ideelt er en lys og solrig placering, der dog skal være beskyttet for middagssolen. Planten stilles helst et vindbeskyttet sted fremfor i fuldstændig i det fri, idet de mange og store blade / blomster byder vinden en stor angrebsflade.

Gødning, vanding og pleje:

Om sommeren vandes rigeligt - bedst både morgen og aften. Rodklumpen skal være rigtig gennem våd ellers viser planten hurtigt hængende og sovende blade. Fra maj til oktober skal der ugentligt gødes med krukkeplantegødning. Næringsstofbehovet er meget højt. Plantepotten /-krukken skal vælges rigeligt stor.

Overvintring:

Vand fra om efteråret mindre og opbevar planten ved en temperatur på 4° til 10° C. Ideelt er et rum med god udluftning - i nødstilfælde også mørkt. Udtynd grenene og giv planten støtte om vinteren eller i det tidlige forår. Omplant Engletrompeten hvert år.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

