

Ginkgo (Tempeltræ)

(*Ginkgo biloba*)

4 frø

Værd at vide:

Ginkgo har eksisteret i over 250 millioner år og kan som træ blive op til 1.000 år gammelt. Det er et viftebladstræ og er så at sige en mellemting mellem et løvtræ og et nåletræ.

Det angribes ikke af ikke a sygdomme, er absolut modstandsdygtigt og tåler endda selv den kraftigste udstødningsgas i storbyer.

Den korrekte stavemåde af navnet er omstridt. Der anvendes ofte følgende fire benævnelser Ginkgo eller Gingko samt Ginko eller Gingo, hvoraf de sidste to er absolut forkerte. Den første er vores foretrukne og i overensstemmelse med den latinske betegnelse.

Oprindelse:

Har været kendt i Europa siden 1750 ellers er det største udbredelsesområde Asien.

Formering:

Såning / spiring af frøene er mulig hele året indendørs. Slib de hassenødde frø let med sandpapir og lad dem ligge i blød natten over i rumvarmt vand. Derefter lægges frøene på fugtig såjord og dækkes med et tyndt lag heraf. Ved en temperatur på mellem 20° og 25° C følge spiringen efter 3 til 4 uger. Er det koldere varer det ofte dobbelt så lang tid.

Placering / lys:

Enhver placering er mulig. Kun unge frøplanter og unge træer skal beskyttes mod solen.

Gødning, vanding og pleje:

Ginkgo vokser rigtigt godt på fugtig, men alligevel godt drænende, og næringsstofrig jord. Vær opmærksom på en jævn vanding. De unge planter blade bliver ellers hurtigt gullige og vil hænge slapt ned. Grundet dens slanke vækst sætter den kun få sidegrene. Tilbageskæring efter juni fremmer en tykkere vækst.

Overvintring:

Fra oktober / november, når Ginkgo'en skifter bladsfarve og senere smider sine blade skal der kun vandes ganske lidt. Træet er vinterhårdført og kun, hvis der er tale om småplanter lønner det sig med en vinterbeskyttelse. Ved for varm overvintring udvikler den hurtigt nye, men for svage skud.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

