

Olietræ

(*Olea europea*)

20 frø

Værd at vide:

Olietræet har været kendt i omkring 6.000 år og regnes til de ældste kulturplanter. Den har aflange, glatte, blå-olivengrønne blade og får gule blomster. Den kan dyrkes dels som busk og dels som træ. Den vokser meget langsomt og udmærker sig ved dens robusthed. Olietræet bliver mange hundrede år gammelt og får over tid den snørklede facon.

Oprindelse:

Formentlig stammer Olietræet fra den østlige del af middelhavsområdet.

Formering:

Såning/spiring er muligt hele året indendørs. Rids de ekstremt hårde frø med en fil eller sandpapir. Lad dem derefter ligge i blød i rumvarmt vand i 24 timer. Derefter sættes frøene i dybde af 1 cm i fugtig såjord, der holdes jævnt fugtig og placeres et meget varmt sted. Spiringen begynder efter 4 til 12 uger.

Placering / lys:

Som alle middelhavsplanter elsker Olietræet en varm og meget lys til solrig plads - også i det fri.

Gødning, vanding og pleje:

Planten tåler meget tørke og er dermed ikke afhængig af jævnlig vanding. Desforuden ødelægger vedvarende våd jord rødderne. Lad derfor roligt jordklumpen tørre op en gang imellem. Fra marts til slut august skal den hver 14. dag tilføres krukkeplantegødning. Ved hyppig beskæring bliver olietræet meget tæt da dets vækst naturligt er meget sparsom.

Overvintring:

Ideel er en lys og kølig plads og mellem 5° og 10° C. Er der for mørkt, kan den tabe alle blade. I så fald må den skæres tilbage og så vil den bryde igen det kommende forår. Vand sparsomt. Olietræet tåler frost ned til 12° C på dets overjordiske dele. Rodklumpen må ikke gennemfryse og skal beskyttes med f.eks. tørv eller kokosmætter.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

