

Macadamianød

(*Macadamia tetraphylla*)

2 frø

Værd at vide:

Ved tilstrækkelig plads udvikler dette 1 meter høje træ fra den australske regnskov en buskagtig form. Den udvikler mørkegrønne, aflange-ovale og læderagtige blade. Ved udspring er de unge grene næsten rosarøde.

Efter nogle år viser de små og selvbestøvende blomster sig. På vores breddegrader blomster træet kun i sommermånederne og den første høst indtræffer tidligst efter 5 år.

Oprindelse:

Macadamianød stammer fra Øst Australien. Deraf kommer det ofte benyttede navn "Queenslandnød".

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Slib først de store og hårde frø med en fil eller sandpapir, dernæst skal de ligge i blød i rumvarmt vand i 24 timer. Efterfølgende sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Såbakken stilles varmt ved ca. 25° C og holdes jævnt fugtig. Efter 6 til 8 uger begynder frøene at spire.

Placering / lys:

Den frostfølsomme plante foretrækker en lys til solrig placering og kan også palceres i det fri om sommeren.

Gødning, vanding og pleje:

Sæt de unge planter i god kompostjord med stor vandlagringsevne (altså jord med højt indhold af ler) og vand meget igennem sommeren og vækstsæsonen. Jorden må ikke tørre op. Den ideelle temperatur ligger mellem 20° og 25° C. Ved en lavere temperatur tager planten ikke skade, men væksten bremses. I perioden fra april til september tilføjes den krukkeplantegødning hver 4. uge.

Overvintring:

I vintermånederne kan temperaturen reduceres til 10° C. Vand mindre end om sommeren, men sørg for at jorden ikke tørre helt op.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

