

Cobralilje

(*Darlingtonia californica*)

10 frø

Værd at vide:

Denne grubefælde har et opretstående rør der øverst oppe drejer sig 180°. Der ses også det, der ligner en spaltet slangetunge, der har givet den navnet Cobralilje. Denne tunge er dækket af nektar, der har til formål at lokke insekterne til og derefter lede dem ind i røret.

Oprindelse:

Cobraliljen er hjemmehørende i Nord- og Sydkalifornien.

Formering:

Gennemfugt dyrkningssubstratet godt og læg frøene oven på dette. Som let spirende frø må de ikke dækkes. Ved en temperatur på 15° til 20° C spirer frøene efter 3 til 6 uger. Lad ikke dyrkningssubstratet tørre ud!

Placering / lys:

Muligt er en solrig placering, men en skygget placering er også en mulighed. Ved fuld sol bliver planterne små med en rødlig overflade.

Gødning, vanding og pleje:

Cobraliljen holdes bedst indendørs i varme, men har behov for en høj luftfugtighed. Den tåler om sommeren temperaturer op til 30° C. Den skal ved høj varme hyppigt overbruses med kalkfrit vand. Den skal vandes godt, men tåler ikke som andre carnivor planter vedvarende våd jord, idet der kan det, at der ved vedvarende våd jord, at rødderne dør. Der kan anvendes speciel jord til carnivor planter eller godt drænende højmosesphagnum iblandet en 1/4 kalkfri sand eller alm. sphagnum.

Overvintring:

Ideelt er det med en overvintringstemperatur mellem 12° til 16° C. Vand planterne fra september lidt mindre (holdes til den tørre side) og fra slut februar øges vandingen igen.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

Bemærk:

Vi leverer frøene sammen med speciel carnivorjord, hvori planterne også kan blive efter fremspiringen.

