

Ginseng

(Panax ginseng)

15 frø

Værd at vide:

Navnet Ginseng ("nøgent menneske") kommer af rodens facon, der mange gange kan minde om et menneske.

Oprindelse:

Planten var oprindeligt vidt udbredt i Kina og Korea. Idag er den stort set udryddet som vild plante i naturen. Dette skyldes voldsom udbytning af den begrundet i de høje markedspriser på ginseng ekstrakt.

Formering:

Frøene er allerede forbehandlet (stratificeret). Sæt frøene i en dybde af ca. 1 cm i fugtig såjord. Det er også muligt at anvende en fuldstændig kalkfri jord, som skal være særdeles godt drænende. F.eks. kan anvendes skovbundsjord fra nåleskove eller bladmuld. Stil såbakken varmt og hold såjorden jævnt fugtig. Spiringen følger efter 1 til 5 uger.

Placering / lys:

Ginseng kan holdes som en attraktiv potteplante i boligen. Den er dog også egnet til haven. Mange planter foretrækker skygge. Ginseng SKAL have skygge. Placeringen skal minde om en skovbund med vekslende skygge og dette afvekslende spil mellem lys og skygge elsker den. Kortvarig indstråling fra solen er befordrende for dens udvikling, men fuld sol er ødelæggende. Hvis det sker "brændes" bladene af solen.

Gødning, vanding og pleje:

Jorden holdes fugtig, men ikke våd, og desuden frostfri. Tilførsel af organisk gødning i august fordre en tykkere roddannelse. I dens 3. år udvikler den dens attraktive røde blomsterstande. Skal den udvikle en så kraftig rod som muligt skal blomsterstanden brækkes af kort efter den har vist sig. Mellem det 4. og det 6. år kan man selv høste Ginsengrødderne. I det tilfælde venter man til de overjordiske dele om efteråret er visnet væk.

Overvintring:

Holdes planten i boligen om vinteren er det bedst med et køligt og frostfrit rum. I denne fase vandes meget sparsomt.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

