

Rødt Silkebomuldstræ

(*Bombax malabaracium*)

15 frø

Værd at vide:

Silkebomuldstræet - også kaldet "Shaving Brush" (barberkost) hører til bomuldtræsvæksterne. Kun i troperne udvikles frøkapsler, hvorfra der efter afmodning udspringer bomulds-lignede hår. Traditionelle japanske Futons og puder der anvendes til Zen-meditation fyldes med denne disse bomuldsagtige hår.

Oprindelse:

Bombax er hjemmørende i Indien, Australien og Malaysia.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene lægges i blød i et døgn i rumvarmt vand og efterfølgende sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Såbakken stilles varmt ved 20° til 25° C. Efter 4 til 5 uger begynder spiringen. Efter yderligere ca. 6 uger kan de små frøplanter prikles ud enkeltvis (omplantes).

Placering / lys:

Bombax placeres hos os på en solrig til fuld sol placering. Så vil den udvikle sig til en prægtig krukkeplante med kraftigt tornet stamme.

Gødning, vanding og pleje:

Fra april til september tilføres den hver 2. eller hver 3. uge krukkeplantegødning. En tilbageskæring til/i "gammelt træ" lønner sig ikke, idet det vil gå ud over blomstringsvilligheden.

Overvintring:

Planten er ikke vinterhårdfør. Den smider sit løb til vinteren og udvikler skarlagenrøde blomster mens den står bladløs. Den skal overvintres lyst og stå ved en temperatur på mellem 10° og 15° C, ideelt er derfor f.eks. en vinterhave. Den skal fortsat vandes jævnlige. Den kan dog også placeres mørkt, men da skal vandingen begrænses meget. Det følgende forår skyder den igen.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

