

## Skruetræ

(*Pandanus utilis*)

5 frø

### Værd at vide:

Pandanus er en palmeagtig, stedsegrøn plante med smalle, sværformede og læderagtige blade der vokser i en skrueform rundt om stammen. Disse drejede blade er allerede på frøplantestadiet lette at genkende. På dens naturlige voksesteder kan den nå en højde på 10 til 15 meter. Ved dyrkning i potter eller krukker er eksemplarer på bare 1 meters højde meget sjældne og værdifulde. Træet står på dets rødder, der delvis er overjordiske. Ved tilstrækkelig varme vokser træet til en majestætisk, smuk og værdifuld solitær krukkeplante.

### Oprindelse:

Skruetræet er et skovtræ hjemmehørende i Afrika, Madagaskar og Sydasiens.

### Formering:

De ret store frø sættes i blød i rumvarmt vand i ca. 24 timer. Afsluttende sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Såbakken holdes jævnt fugtig og sættes varmt. Hvordan frøene placeres i jorden er ligegyldigt, idet spirerene altid bryder i frøets svageste punkt. Af og til begynder spiringen allerede efter 2 til 3 uger. Står såbakken køligt kan der også gå op til 4 til 8 uger før begyndende spiring. Allerede når de første blade er 6 til 7 cm lange er de let drejede og får efter nogle uger "tænder" på siderne og bliver meget stabile.

### Placering / lys:

Unge planter kan problemløst dyrkes i en stue, de behøver dog kalkfattigt vand og en halvskygget til lys placering. Ved prikling / omplantning, når de er ca. 2 måneder gamle, skal de sættes enkeltvis i luftig jord. Herefter vil de også kunne tåle noget sol.

### Gødning, vanding og pleje:

Fra april til oktober tilføres palmegødning hver 3. til hver 4. uge. Døde / visne blades kan man roligt fjerne med hånden.

### Overvintring:

Skruetræet tåler ikke frost.

### Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

