

Kængurupote (flavidus)

(Anigozanthos flavidus)

Værd at vide:

Denne stedsegrønne stau­de med dens iøj­en­fal­den­de og me­get attrak­ti­ve rør for­mede blom­ster, der i deres form min­der om kængu­rupo­ter er ogs­å hos det rene farve­vidun­der og kan gå for at være "SPECIALITETEN" un­der de udtalte dyrknings­nem­me Aus­tralske krukkeplanter.

Oprindelse:

Dens oprindelse er Syd- og Vestaustralien.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Kængurupoten lader sig let og hurtigt formere fra frø. Strø de fine frø, jævnt fordelt, ud på gennemfugtet såjord og dæk derefter frøene ganske lidt med et tyndt lag såjord. Såbakken stilles ved en temperatur på 18° til 20° C og spiringen følger typisk efter 2 til 3 uger. Det kan dog forekomme, at der kommer nogle efternølere efter 8 til 10 uger. Da der er tale om en stau­de kan ældre planter deles om efteråret.

Placering / lys:

Kængurupoten foretrækker lyse til fuld sol samt varme placeringer. Jo mere solrig, jo righoldigere blomstring.

Gødning, vanding og pleje:

Kængurupoten har behov for en let, sandholdig og let sur jord (pH på indtil 6). Om sommeren er vandbehovet til gengæld højt og må jorden ikke være vedvarende våd. Da planten foretrækker eller kalkfattigt vand skal ledningsvand afkalkes eller endnu bedre er det, at anvende regnvand. Næringsstofbehovet er ikke så stort. En tildeling af krukkeplantegødning fra slut april til slut august hver 3. uge er tilstrækkelig. Afblomstrede stilke skal skæres af da de kun blomstre en gang. Afskårne stilke blomster også i en vase og det endda ret længe.

Overvintring:

Kængurupoten er ikke frostsistent og behøver for en ideel overvintring en lys plads mellem 10° og 15° C. Den kan også skæres helt tilbage. Om vinteren vandes der sparsomt.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

