

Palme - Dværg Hamppalme (Trachycarpus nanus)

10 frø

Værd at vide:

Denne palme er vel den mest udsædvanlige af alle hamppalmer. Den er stammeløs og bliver kun ca. 1 meter høj. Dens bladvifter er sølvblå og vokser kun lige ovenfor jordoverfladen. Den tåler ekstrem kulde og regnes for den mest frost hårdføre palme overhovedet.

Oprindelse:

Dværg Hamppalmen vokser i syd-vest Kinas gøldede bjerge i en højde af 2.000 til 2.500 meter.

Formering:

Såning/spiring er muligt hele året indendørs. Lad frøene først stå i blød i rumvarmt vand natten over. Dernæst sættes frøene i dybde af 1 cm i fugtig kokosfiberjord eller alm. såjord. Efter såningen må jorden ikke udtørre. Ved 20° til 25° C spirer frøene efter 2 til 6 uger.

Placering / lys:

Ideelt er en lys solrig plads. Trives dog også i halvskygge, men vokser her langsommere.

Gødning, vanding og pleje:

Om sommeren skal den holdes fugtig hele tiden, men undgå vedvarende våd jord. Fra marts til oktober gives den palmegødning hver 2. uge. En svær næringsrig lerjord er optimal.

Overvintring:

I boligen skal viftebladene overbruses på grund af den tørre indendørsluft (ellers bliver bladspidserne brune) og den skal vandes sparsomt. Udendørs skal rødder/rodzone beskyttes ved tildækning. Ved en "mørk" overvintring skal palmen om foråret stå i halvskygge til at begynde med for at undgå "afbrænding" af bladene. Dværg Hamppalmen er rigtig frostresistent så snart de første delte blade viser sig. Den tåler endda sne og lange frostperioder og dermed er den ideel til udplantning.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

