

Darjeeling banan

(*Musa sikkimensis* syn. *M. hookeri*)

5 frø

Værd at vide:

Denne vinterhårdføre bananart hører til de store bananarter og kan nå en højde på 4,50 meter. Stammen er rødlig og har en diameter på op til 40 cm. Bladene besidder også en rødlig farve. Darjeeling bananen udvikler spiselige, søde og kerneløse frugter.

Oprindelse:

Hjemegnene for denne banan art er de nordøstlige bjergskove i Himalaya og i Nordøst Indien i 2.000 meters højde

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Slib de hårde frø med sandpapir og lad derefter frøene ligge i blød i rumvarmt vand i 12 timer. Efterfølgende sættes frøene i fugtig såjord og de dækkes med et tyndt lag af såjorden. Hold såjorden jævnt fugtig og stil såbakken meget varmt - 25° til 30° C. Så begynder spiringen efter 3 uger - ved en koldere placering kan spiringen tage helt op 5 til 10 uger.

Placering / lys:

Ideelt er lyse og solrige placeringer - om sommeren også i det fri på en vindbeskyttet plads.

Gødning, vanding og pleje:

Darjeeling bananen vokser meget hurtigt, når den har tilstrækkelig plads, humusholdig jord, og tilføres meget vand. Den trives i krukke og udplantet. Fra midt april til oktober skal planten tilføres krukkeplantegødning ugentligt.

Overvintring:

Bladene overlever -3° C. Om vinteren skæres hele planten af i jordhøjde. Idet fri overvintre planten, hvis man afdækker rodzonen med løv eller halm og sætter f.eks. en trækasse derover, der igen dækkes med plast for at forhindre regn i at nå roden. Næste forår skyder roden påny igen.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

