

Guldfyr

(*Pinus ponderosa*)

20 frø

Værd at vide:

Denne statelige fyr bliver på dens hjemegn indtil 90 meter høj og dermed regnes den for det største fyrretræsart i verdenen. Den kan blive op til 500 år gammel. I Europa ligger den maksimale højde på 20 meter.

"Ponderosa" betyder oversat noget med "tung / vægtfylde / svær". Dette navn henviser til det meget tunge og meget værdifulde træ. *Pinus ponderosa* blev først indført til Europa i 1827 og i engelsktalende områder kaldes den "Golden Pine" eller "Yellow Pine".

Oprindelse:

Fremherskende i Nordamerikas Stillehavsområde.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene lægges i en skål og denne stilles i køleskabet i 5 til 7 dage for at få en optimal stratificering. I denne kølefase nedbrydes de spirehæmmende stoffer i frøet. Det er ikke ubetinget nødvendigt, at frøene forbehandles, men spiringsprocenten kan forbedres ved forbehandlingen. Efterfølgende sås frøene i en dybde af 1,0 cm i fugtig såjord eller havejord. Spiringen følger efter 4 til 10 uger.

Placering / lys:

Vælg en fri og solrig placering. Guldfyr kan også trives i byklimaer.

Gødning, vanding og pleje:

Guldfyr trives i alle havejorde. Selv et lidt højt kalkniveau skader den ikke. Til vand- og næringsstofforsyning stiller den også kun begrænsede krav. Lange perioder uden nedbør overlever den også problemløst. Modtagelig for sygdomme er den heller ikke. Som ung plante er Guldfyr hurtigtvoksende herefter er den meget langsomtvoksende.

Overvintring:

I Mellemeuropa er Guldfyren fuldstændig vinterhårdfør.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

