

## Rød Vifteahorn

(*Acer palmatum atropurpureum*)

20 frø

### Værd at vide:

Ahorntræer er, på grund af deres farvespil om foråret og efteråret, særdeles skattede træer. I marts viser det røde løv sig, senere toner det over i grønt, for igen om efteråret at blive lysende rødt.

### Oprindelse:

Træet findes fra Øst- til Vestasien. I Canada findes der også mange Ahorn arter.

### Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene er allerede stratificerede alligevel skal frøene lægges i køleskab i 5 til 6 dage, hvorefter de sættes i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Til begyndende spiring kan der gå 10 til 12 uger.

### Placering / lys:

Rød Vifteahorn elsker solrige til halvskyggede placeringer. For at undgå brune bladspidser skal en placering med fuld middagssol undgås.

### Gødning, vanding og pleje:

Vand regelmæssigt og meget. Rodklumpen må dog gerne tørre let op ind imellem. Fra april til oktober skal planten tildeles krukkeplantegødning hver 4. uge.

### Overvintring:

De lysende røde blade affarves i det sene efterår og falder af. Om vinteren må rodklumpen ikke tørre helt op. Rød Vifterahorn er absolut vinterhårdfør.

### Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

