

Alaska Sortfyr

(*Pinus nigra*)

50 frø

Værd at vide:

Alaska Sortfyr er et hurtigtvoksende træ, der i Alaska kan blive op til 60 meter højt. Der findes træer der er op til 500 år. Navnet har det fået på grund af den sort/brune bark. Alaska Sortfyren kan vokse på grusskråninger, kan klamre sig til klipper og kan vokse næsten uden næringsstoffer. Den er absolut tilpasningsegnet.

Oprindelse:

Den er udbredt i de højere liggende dele af Pyrenæerne over til Krim og til de højere liggende dele af Alaska.

Formering:

Såning / spiring er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød i rumvarmt vand natten over og sæt efterfølgende frøene i fugtig såjord eller sandholdig havejord. For at spiringen skal lykkes kræves en kølig placering. Spiringen følger efter 6 til 12 uger.

Placering / lys:

De unge frøplanter sættes i god og godt drænende havejord og beskyttet mod direkte sol. Ideelt er en jord bestående af 50% havejord, 25% groft sand og 25% sphagnum. Da den vokser meget kraftigt skal den tildeles en fri plads.

Gødning, vanding og pleje:

Træet vokser kegleformet i begyndelsen og senere med kraftigt udhængende grene. Det kræver ingen pleje. Den første blomstring og kogledannelse starter efter ca. 15 år. I Europa har træet grene langt ned af stammen. I Alaska ses ofte kun grene på træets øverste halvdel, hvorved træet kan se ret bizart ud i det temmeligt gold landskab der.

Overvintring:

Da *Pinus nigra* en besidder tilstrækkelige egenskaber for vinterhårdhed, er det overhovedet intet problem med overvintring på vores breddegrader.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

