

Læbestift busk

(*Bixa orellana*)

20 frø

Værd at vide:

På verdensplan bliver denne skønne, ca. 2 meter høje busk plantet i varmere regioner, dels om prydpante dels af kommercielle årsager idet der af dens kødrige frøskaller udvindes det fuldstændige ugiftige farvestof E160.

Dette farvestof bruges blandt andet til fremstilling af læbestifte og farvning af levnedsmidler som f.eks. Cheddar ost.

Særligt karakteristisk for denne plante er de store hjerteformede blade og de opret stående duske af små rosa rosenlignende blomster. Særligt iøjenfaldende er også de mandelformede frugter, der er tæt besat med røde børster.

Oprindelse:

Bixa er hjemmehørende i tropisk Amerika. I alle tropiske lande har den længe været dyrket som pryd-og/eller nytteplante.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød natten over i rumvarmt vand. Derefter fordeles frøene på fugtig såjord. Dæk frøene med et 1 cm tykt lag af såjorden. Såbakken holdes jævnt fugtig og stilles ved en temperatur på mellem 22° til 25° C. Frøene spirer relativt hurtigt indenfor 2 til 5 uger efter såning.

Placering / lys:

Planten trives godt på halvskyggede til solrige placeringer. Hos os kan Læbestift busken kun i varme somre og da på en vindbeskyttet plads stå i det fri.

Gødning, vanding og pleje:

Ved dyrkning i almindelig enhedsjord i en krukke kan planten med jævnlige beskæringer formes til et lille træ eller en busk. Fra maj til oktober skal den tilføres krukkeplantegødning hver 3. uge. Der vil gå nogle år inden første blomstring indtræffer.

Overvintring:

Læbestift busken elsker også en så lys overvintringsplads som muligt, der ubetinget skal være frostfri. Ved en varm placering skal tør luft undgås og dette kan gøres med hyppige overbrusninger.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

