

Stor spisebanan

(Musa x paradisiaca)

10 frø

Værd at vide:

Denne 2 til 3 meter høje "urtidsbanan" har været dyrket i årtusinder. Denne bananstaude er flerårig og er let at kende på dens store, over 1 meter lange, blade.

Fra den "falske" stamme kan der efter 3 til 4 år udvikles en nedadbuget blomsterstilk med en rødlig til violet blomst. Efter frugtudviklingen dør planten hen. Før dette har den fra rødderne udviklet nye skud, hvorfra nye planter kan udvikle sig.

Oprindelse:

Den har sin oprindelse i Sydøstasien, men er udbredt overalt i troperne.

Formering:

Såning/spiring er muligt hele året indendørs. Slib eller rids de hårde frø let med sandpapir eller en fil før udsåning. Herefter lægges frøene i blød i rumvarmt vand natten over og sæt derefter frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved en relativ høj temperatur på 23° til 25° C spirer frøene efter 3 til 7 uger.

Placering / lys:

Skal planten blomstre og sætte frugter skal den helst stå i et drivhus eller en vinterhave hele året og helst ved en temperatur på ikke under 16° C.

Gødning, vanding og pleje:

Plant de unge planter efter 4 til 5 uger over i en stor krukke / potte med næringsstofrig og godt drænende jord. Tilførsel af 25% sand forbedre væksten kraftigt. Om sommeren vandes rigeligt og gødning gives hver 14. dag i perioden april til oktober. Bananen vokser meget hurtigt og kan om sommeren placeres udendørs på en vindbeskyttet plads.

Overvintring:

Vinterplacering skal være lys og må ikke komme under 10° C. Vand betydeligt mindre. Overbrus af og til bananplanten med kalkfrit vand for at forhindre angreb af skjoldlus, hvis luften er for tør.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

