

Kæmpe Sommerfuglblomst

(*Hedychium gardnerianum*)

10 frø

Værd at vide:

Den statelige, ca. 2 meter høje staude henregnes til Ingefærvæksterne og hører til blandt de prægtigste blomstrende planter i troperne såvel som subtroperne. Bladene bliver 20 til 40 cm lange og de ca 45 cm høje blomsterstok udvikler mange gule blomster, der dufter meget behageligt. Blomstringstiden er mellem begyndelsen af august til begyndelsen af oktober.

Oprindelse:

Planten er hjemmehørende i Indien, Himalaya og Indonesien.

Formering:

Såning / spiring er muligt hele året indendørs. Formering af frøene foregår problemløst, men den blomster dog først efter 2 til 3 år. Sæt frøene i den fugtige såjord og hold denne jævnt fugtig og varm. Spiringen følger efter 2 til 4 uger.

Placering / lys:

Den skal have en varm og solrig placering. Kun på den måde opnås blomstring. Står den imponerende krukkeplante udenfor om sommeren skal den beskyttes mod vedvarende regn.

Gødning, vanding og pleje:

Sommerfuglblomsten trives i humusrig enhedsjord og kræver gennem vækst- og blomsterfasen ensartet fugtighed. Kortvarig tørke klarer den dog problemløst. Vedvarende våd jord skal undgås da planten ikke bryder sig om dette. Fra april til slut september bør den ugenligt tilføres krukkeplantegødning. Næringsstofbehovet er meget stort.

Overvintring:

En ideel vinteropbevaring er en lys placering ved en temperatur på 10° til 15° C. Giv af og til planten tåge (overbrusning eller dampen på et badeværelse, hvor man tager et varmt brusebad) da der ved tør luft kan forekomme angreb af spindemider eller bladlus. Da planten i naturen forekomme i højder af 2.000 meter er den ret kuldetolerant. De overjordiske grønne plantedele kan afskæres, og rodknolden kan herefter overvintres frostfrit i en kasse med sand. Det følgende forår vil den skyde på ny.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

