

## Libanon Ceder

(*Cedrus libani*)

20 frø


### Værd at vide:

Det stedsegrønne, næsten uddøde træ er en del af Libanons nationalvåben og pryder også dets flag. Den kan nå en alder på næsten 900 år og en højde på 25 til 30 meter.

Iøjenfaldende er den flade krone hos ældre træer. Den ældste Libanon Ceder i Tyskland står i Weinheim slotspark og blev der plantet omkring år 1710. Cedertræ angribes ikke af insekter og dufter meget behageligt i årtier.

### Oprindelse:

*Cedrus libani* har sin oprindelse i Libanon, men også i Tyrkiet findes større samlinger af denne art.



### Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød i 1 til 2 dage i rumvarmt vand. Sæt efterfølgende frøene i fugtig såjord eller løs sandholdig jord. Frøene spirer meget uensartet efter 3 til 12 uger.

### Placering / lys:

Planten har behov for meget lys, sol og varme. En næringsstofrig og godt drænende jord hører også til, for at opnå en sund vækst. Unge træer har en smal, opret vækst og den udvikler mørkegrønne nåle med en længde på op til 4 cm.

### Gødning, vanding og pleje:

Cederen bliver, på grund af dens usædvanlige form og dens voksevillighed, meget værdsat. Fra dens andet år kan den tilføres nåletræsgødning. Gødes i perioden start maj til slut oktober.

### Overvintring:

Libanon Ceder'en er kun vinterfast i de milde Mellemeuropæiske lande. Dyrkes den på vores breddegrader og skal den holdes som krukkeplante og tages ind for overvintring. Placeres lyst, køligt og vandes moderat. Skal den vokse i det fri skal den vinterbeskyttes mod frost og vind.

### Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.