

Gult Orkidetræ

(*Bauhinia tomentosa*)

30 frø

Værd at vide:

Denne prydbusk med sine hængende, klokkeformede og lysegule blomster regnes til de sjældneste af de ca. 300 Orkidetræ arter, idet de fleste arter blomstre rødt, rødligt eller hvidt.

Blomsterne dufter herligt og bladene vokser med skiftevis forskudt med lappede blade, med en form som en kamelfod.

Oprindelse:

Gult Orkidetræ er hjemmehørende i subtropisk og tropisk Afrika og Asien.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød i rumvarmt vand i 12 timer. Derefter trykkes de fast (fladt) på den fugtige såjord. Frøene dækkes kun med et ganske tyndt lag af såjorden. Hold såjorden jævnt fugtig. Ved en temperatur på mellem 20° til 25 ° C spirer frøene efter 2 til 4 uger.

Placering / lys:

Planten elsker lyse til fuld sol placeringer. Det må også gerne være meget varmt. Kun kold vind tåler det ikke.

Gødning, vanding og pleje:

Det Gule Orkidetræ vokser som prydbusk henholdsvis et lille træ men, det lader sig også dyrke, som mange *Bauhinia* arter gør, som Lian eller klatreplante. Det Gule Orkidetræ trives fremragende på let, frugtbar og godt drænende jord. Det udvikler en kort stamme. En tilbageskæring er kun nødvendig ved for stærk vækst og i det tilfælde da kun efter blomstring. Det skal vandes regelmæssigt og tilfød det krukkeplantegødning hver 3. uge i perioden fra start april til slut august.

Overvintring:

Planten er kun i meget begrænset omfang frostresistent. Ved en kølig og tør placering smider den om efteråret sit løv. Tillader pladsen det, kan den overvintres ved en temperatur på 12° til 18° C. Der vandes lidt.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

