

Citron Eukalyptus

(*Eucalyptus citriodora* syn. *E. maculata*)

200 frø

Værd at vide:

Denne eukalyptus vokser som stedsegrøn busk eller et lille træ og skiller sig ud gennem bladenes intensive duft af citron.

Den vokser langsomt og udvikler 10 cm lange, lancetlignende blade. Blomsterstandene består af mange hvide blomsterskærme.

Citron Eukalyptus anbefales på det varmeste til dyrkning i krukker. Ved omplantninger skal man være særlig agtpågivende for ikke at komme til at beskadige rødderne.

Oprindelse:

Den oprindelse skal findes i Queensland i Australien.

Formering:

Såning og spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De meget små og fine frø strø ud på fugtig såjord. De dækkes kun med et tyndt lag jord. Ved en temperatur på 20° C spirer frøene allerede efter 2 til 3 uger. Frøplanterne skal blive i såbakken ca. 2 måneder for at rødderne kan nå at udvikle sig tilfredsstillende. Eventuelt kan anvendes et rodningshormon.

Placering / lys:

Citron Eukalyptussen skal have en lys, solrig og varm placering.

Gødning, vanding og pleje:

Generelt skal Citron Eukalyptussen vandes meget og især om sommeren skal den have rigtig meget vand. Det skal være kalkfrit vand der skal anvendes. For at undgå vedvarende våd jord er et drænlag af f.eks. lergranulat i bunden af potten ideelt. Gød forsigtigt, det er tilstrækkeligt med tildeling af gødning hver 4. uge i perioden april til september. Eukalyptussen kan skæres tilbage eller udtyndes efter behov, hvis den er blevet for stor. Rødderne må ikke beskæres.

Overvintring:

Det er vigtigt med en lys placering. En optimal temperatur er på 5° til 10° C og med et godt luftskifte. *Eucalyptus citriodora* tåler ikke frost.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

