

Rød Helikon

(*Heliconia pendula* syn. *Heliconia collinsiana*)

10 frø

Værd at vide:

Denne skønne eksotiske plante med dens store blade og aks såvel som de farverige dækblade regnes til bananvæksternes familie. Den er stedsegrøn, flerårig og en udpræget fugleblomst da blomsterbladene fra basis udvikler og udskiller nektar. *Heliconia pendula* bliver 2-3 meter høj og udvikler en kratlignende mængde tynde stilke, hvorpå de 25 cm lange blomster hænger. Disse er lysende røde og omslutter de egentlige guldgule blomster.

Oprindelse:

Heliconia pendula har sin oprindelse i tropisk Amerika som f.eks. Guatemala.

Formering:

Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De ret hårde frø lægges i blød i rumvarmt vand i 24 timer. Derefter sås de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord eller lersten. Ved jævn fugtighed og en temperatur på 22° til 27° C spirer frøene efter 3 - 8 uger.

Placering / lys:

Den ideelle placering er en halvskygget plads med en minimumtemperatur på 18° C hele året igennem.

Gødning, vanding og pleje:

Humusrig jord og jævn fugtighed såvel som overbrusning af bladene er forudsætningen for en sund vækst. Særligt godt er det at vande med kalkfrit vand (regnvand). For at fremme udviklingen af nye skud skal døde blade/blomster løbende fjernes. I vækstsæsonen skal den hver 14. dag tildeles kalkfri gødning.

Overvintring:

Heller ikke om vinteren må temperaturen komme under 18° C. Det er vigtigt jævnligt at forstøve kalkfrit vand over bladene. Ved for tør luft kan planten blive angrebet af såvel spindemider som skjoldlus.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

