

Rød Dværg banan

(*Musa coccinea* syn. *Musa uranoscopus*)

10 frø

Værd at vide:

Den Røde Dværg banan også kaldet Scarlett banan eller Rød Thai banan, udvikler de skønneste blomster af alle dværg bananer. De er store, lysende røde og holder ca. 2 måneder. Planten selv bliver maksimalt 2 meter høj og danner en pseudostamme samt smalle lysende grønne blade. Disse bliver ca. 80 cm lange.

Den er nem at holde og problemløs at dyrke - den ideelle bananplante at holde som indendørs potte- eller krukkekultur.

Oprindelse:

Musa coccinea er hjemmehørende i Indien og Asien, i særdeleshed Thailand.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene lægges i blød i rumvarmt vand eller i varmt vand (i en termokande) i 24 timer. Dernæst fordeles frøene på fugtig såjord eller kokosfibre og dækkes med et tyndt lag såjord. Såbakken stilles varmt og jorden holdes fugtig - ikke våd. Ved jævn fugtighed og en temperatur på 20° til 25° C spirer frøene efter 4 til 10 uger. Hav tålmodighed.

Placering / lys:

Dværgbananen elsker en lys til fuld sol placering. Om sommeren bør den dog beskyttes mod den kraftige middagssol.

Gødning, vanding og pleje:

I en næringsstofrig og løs jord vokser den rodskydende bananstaude ret hurtigt. Om sommeren tildeles den krukkeplantegødning hver 3. uge. Vandes regelmæssigt og godt, men undgå vedvarende våd jord. Den tåler temperaturer på op til 40° C.

Overvintring:

Om vinteren bliver nogle blade brune. Det er helt normalt. Den stilles lyst om vinteren, vandes lidt mindre og placeres et sted med en temperatur på mellem 5° til 12° C. Den tåler dog temperaturer på op til 25° C, men skal så overbruses med kalkfrit vand. Ved overvintring i det fri skæres pseudostammen af lidt over jordoverfladen og stubben dækkes med et dækmateriale (løv, kompost eller lign.). Eventuelt sættes en kasse/balje med bunden i vejret over stubben/rodklumpen.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

