

## Brasiliansk Fløjteblomst

(*Aristolochia labiata*)

10 frø

### Værd at vide:

Denne hurtigtvoksende *Aristolochia* er en klatreplante. Den kaldes også "Pelikan-Blomst" da den, set fra siden, minder om en pelikan med åbent næb. I engelstalende lande kaldes den også "Dutchman's pipe wine". Blomsterne bliver meget store og cremhvide med brun-lilla mønstre.

### Oprindelse:

*Aristolochia labiata* har sin oprindelse i Brasilien.

### Formering:

Såning / spiring er muligt hele året indendørs. De tynde frøplader sættes i en dybde af 1/2 cm i fugtig såjord. Såbakken stilles varmt og holdes jævnt fugtigt - ikke våd. Straks efter spiring skal de små frøplanter støttes med en træpind på grund af det er en slyng- / klatreplante. Ved en højde på 15 til 20 cm kan frøplanterne deles. Vælg en krukke, hvor det er muligt, at placere et passier af passende form. Anvende humusrig jord til plantningen.

### Placering / lys:

Forår og efterår bør placeringen være let solrig. Om sommeren foretrækker planten en skygget placering.

### Gødning, vanding og pleje:

En høj luftfugtighed er ideel. Alternativt kan planten af og til overbruses med kalkfrit vand med hjælp af en bestøver. I modsat fald er der fare for angreb af spindemider. Den skal tilføres krukkeplantegødning hver 4. uge i perioden april til september. Blomsterne udvikles om sommeren. Takket være den hurtige vækst kan rankerne nå en længde af op til 3 til 6 meter. Om foråret skal forrige års gamle skud skæres tilbage til 30 cm over jordoverfladen.

### Overvintring:

Planten tåler ikke frost.

### Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

