

Pink Sovetræ (Pink Silketræ)

(*Albizzia julibrissin* "rosea" var. Ernest Wilson)

50 frø

Værd at vide:

Dette "Sovende Silketræ" er et af de hårdeste og smukkeste af alle *Albizzia* arter. I beskyttede områder kan det nå en højde på 6 meter og er på grund af dets skærmagtige krone en værdsat vækst i japanske haver. Ved dyrkning i krukker bliver det naturligvis meget mindre.

Oprindelse:

Planten findes overalt i tropiske og subtropiske egne på vores jord.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød i rumvarmt vand natten over. Derefter sættes frøene i fugtig såjord og dækkes med et lag heraf på 1 cm. Ved en varm placering af såbakken spirer frøene allerede efter 7 til 10 dage.

Placering / lys:

Planten har behov for en varm og halvskygget placering. Fra midt maj til start oktober kan planten også placeres udendørs.

Gødning, vanding og pleje:

For en optimal vækst og en rig blomstring har Sovetræet behov for en stor potte / krukke. Hvis dette er tilfældet kan Sovetræet nå en højde på 1,50 meter allerede det første år. Gennem flere ganges klipning får man en buskagtig men graciøs vækst. Om sommeren vandes der meget og bedst hver dag, men undgå vedvarende våd jord. Fra forår til efterår tildeles den løbende krukkeplantegødning.

Overvintring:

Ideelt er en lys placering ved en temperatur på mellem 5° og 15° C. Vand kun sporadisk. Ved varme vokser Sovetræet videre, men skal ved tør luft overbruses med en forstøver. Fra dets 3. år er træet så robust, at det kan plantes ud. Ved behov vinterbeskyttes det.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

