

Hvid Flagermusblomst

(*Tacca integrifolia*)

15 frø

Værd at vide:

Den bizarre, men stadig meget smukke plante er også kendt i Asien som Dæmonblomsten. Planten bliver maksimalt 100 til 120 cm høj og udvikler 50 cm lange elegante og mørkegrønne blade.

Blomsten minder om Batmans´ s kappe - eller er det Batman der har fundet inspiration ved at iagttage planten.

Fra blomsten hænger der 30 til 50 cm lange støvdragere. Hos os kan denne rodskydende plante dyrkes i stuen, i vinterhaven, i drivhuset og i krukker på terrassen. Dog skal den tages ind når temperaturen når ned på +5° C.

Oprindelse:

Den hvide Flagermusblomst er hjemmehørende i Sydøstasien.

Formering:

Såning/spiring er muligt hele året indendørs. De bitte små frø spirer for det meste ret langsomt. Ideelt er det med en spiringstemperatur i dagtimerne på 22° til 27° C og om natten på 20° C. Dette kan lade sig gøre på en radiator eller et minidrivhus med temperaturregulering. Frøene trykkes fast på fugtig såjord, dækkes let og hold såjorden jævnt fugtig (ikke våd). Før såning kan man lade frøene stå i blød, hvilket vil fremme spiringen, der på trods af dette vil kunne vare indtil 3 måneder. Kimplanterne må først prikles/omplantes efter de har fået 2. bladpar.

Placering / lys:

Unge planer kan lide lyse placeringer uden direkte solindstråling. Bedst med en temperatur på 20° til 25° C.

Gødning, vanding og pleje:

Om sommeren vandes der kraftigt og bliv ved med at overbruse planten. Jorden skal være lerholdig. Først fra 18° C føler *Tacca*´en sig veltilpas. Ungplanter skal ikke gødes. Ældre eksemplarer skal gødes fra foråret til efteråret hver 4. uge med krukkeplantegødning.

Overvintring:

Planten, hvis den står på terrassen, skal tages ind senest når temperaturen når +5° C. Overvintring går også ved en temperatur på 5° til 15° C, men så skal der næsten ikke vandes. Fra rødderne kommer der nye skud næste forår.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

