

Gul Trompetbusk

(*Tecoma stans*)

30 frø

Værd at vide:

Gul Trompetbusk - også kaldet Trompetbloms eller Trompettræ - vokser hos os som stedsegrøn busk eller et lille træ i stuen eller som krukkeplante på altan / terrasse.

I troperne og Middelhavsområdet er denne plante et populært parktræ. Det har fjerede blade og fra grenspidserne udvikler der sig hele året igennem duske med guldgule, 5 cm store og trompetlignende blomster. I inderst i svælget er får de en let rødlig farve.

Oprindelse:

Tecoma stans er hjemmehørende i området fra Mexico til Peru og Argentina. I vore dage findes den også udbredt i mange parker i Florida og Middelhavsområdet.

Formering:

Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De tynde lange og papirlignende frø lægges i "blød" i en fugtig klud natten over. Så frøene direkte i potter da højst 4 til 8 frø pr. potte. Frøene trykkes let fast på den fugtige jord, hvorefter de dækkes med et tyndt lag heraf. Potten eller såbakken holdes jævnt fugtig. Spiringen begynder efter 2 til 4 uger. Prikling / ompotning foretages først efter andet bladpar har udviklet sig.

Placering / lys:

Lys og sol er en forudsætning for prægtige blomster. I skygge vokser den kun lige akkurat og blomstringen er meget sparsom.

Gødning, vanding og pleje:

Om sommeren vandes meget og fra april til oktober gødes meget. Der gødes bedst med flydende krukkeplantegødning hver uge. Unge planter kan man roligt klippe flere gange igennem vækstperioden for at opnå en busket vækst. Ved frøsætning kan / bør disse frøstande fjerne da de reducerer blomstringen betydeligt.

Overvintring:

Den ideelle vinterplads er lys og der skal være en minimumstemperatur på 10° C. Så vil planten nemlig beholde løvet. Ved mørk opbevaring og en temperatur på højst 10° C vil den smide løvet. Der vandes kun sporadisk. I varme rum og tør luft skal man passe på angreb af hvide fluer (foretag en hyppig overbrusning for at imøde gå dette).

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

