

Slangehudsfyr

(*Pinus leucodermis*)

20 frø

Værd at vide:

Denne fyrretræsart regnes til de smukkeste havefyrretræer overhovedet. Den er ideel til sten- og Japanske haver, da den vokser meget langsomt. Efter ca. 10 år er dette nåletræ ca. 30 cm højt, hvilket betyder en gennemsnitlig tilvækst på 2 til 3 cm pr. år. Den er busket og mørkegrøn. Den når en højde på maksimalt ca. 1,5 meter.

Dens navn tilskrives dens lysegrå, glatte stamme der har et mønster der minder en om slangehud. Dertil udvikler den vidunderlige, mørkviolette kogler og dertil er den tørkeresistent.

Oprindelse:

Dens hjemegn ligger i Sydøsteuropa og Syditalien. Træet blev første gang "opdaget" på Balkan i 1865.

Formering:

Såning / spiring er muligt hele året indendørs. Da de fleste nåletræer er "koldtspirende" skal frøene lægges i køleskab / fryser ved 0° til -3° C i ca. 10 dage. På den måde nedbrydes de i frøet spirehæmmende stoffer. Derefter sås frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord eller meget sandholdig jord, hvorefter de dækkes med et tyndt lag af såjorden og afslutningsvis trykkes det hele let til. Såjorden holdes jævnt fugtig og beskyttes mod stærk sol. Der kan gå op til 3 til 12 uger før begyndende spiring.

Placering / lys:

Placeres lyst til solrig.

Gødning, vanding og pleje:

Jorden behøves ikke være særlig næringsstofferig. Planten tåler også kalkholdig jord med en god drænende effekt. Slangehudsfyren har et lille vandbehov og overlever længere tørkeperioder meget godt.

Overvintring:

I Mellemeuropa er dette langsomtvoksende træ fuldt vinterhårdført.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

