

## Australsk Flaskerenser (pink)

(*Callistemon speciosus*)

100 frø

### Værd at vide:

*Callistemon speciosus* vokser til en busk henholdsvis lille træ på (0,5 til 2 meter). Der er meget sjældent at se og den blomstre lysende pinkfarvet.

De næsten skrigende pinkfarvede 10 til 15 cm lange blomster falder straks en i øjnene, og man kigger på den mere end en gang da den ser så usædvanlig ud som den gør. Den kompakte og robuste plante er ideel til dyrkning i større potter eller krukke.

### Oprindelse:

Australien i delstaterne Queensland og Victoria.

### Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Strø de ekstremt fine frø ud på gennemfugtet såjord og dæk dem efterfølgende med en tyndt lag såjord. Ved en jævn fugtighed og varme spirer frøene efter 6 til 8 uger. I frøplantestadiet vokser planten meget langsomt.

### Placering / lys:

Den Australske Flaskerenser elsker en lys og solrig placering.

### Gødning, vanding og pleje:

Planten trives i enhedsjord og har behov for rigeligt vand. Det er bedst at anvende blødt/afkalket vand eller regnvand, idet den Australske Flaskerenser er ømfindelig over for kalk. Planten skal tilføres krukkeplantegødning ugenligt i perioden fra april til oktober. En tilbageskæring efter blomstring fremmer en buskagtig vækst og den nye blomstring. Om sommeren skal må forklumpen ikke tørre op, den skal holdes vedvarende fugtig, idet udtørring kan forvolde planten betydelig skade.

### Overvintring:

Vand mindre om vinteren. Rodklumpen må dog heller ikke tørre ud i denne periode. Ideelt er en lys placering og ved en temperatur på 8° til 12° C.

### Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

