

Gult Cylinder Sovetræ

(*Paraserianthes lophantha* syn. *Acacia lophantha* (Wild.))

20 frø

Værd at vide:

Gult Cylinder Sovetræ med dets fine, kraftigt lysende grønne bladpar og de gule blomster, der bliver 10 til 12 cm lange og som fremstår som en flasketræ, er det mest robuste og hurtigt voksende af alle Sovetræer. Desuden er det også mere sjældent end Pink Sovetræ (*Albizia julibrissin*).

Træet har haft mange navne, f.eks. Duskblomstret Albizie, Cylinder Albizie eller i Frankrig hedder den "a Fleurs en touffes". Englænderne kalder den "Plume Albizia".

Hos os bliver den en prægtig og trivelig krukkeplante. Afhængig af omfanget af tilbageskæringen kan Gult Cylinder Sovetræ holdes i en højde af 1 til 4 meter. Blomsterne viser sig fra oktober til januar. Denne plante er også meget velegnet til bonsai dyrkning.



Oprindelse:

Gult Cylinder Sovetræ har sin oprindelse i Australien og her vokser planten i op til 600 meter over havet.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød i rumvarmt vand natten over og efterfølgende sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved en varm placering spirer frøene efter ca. 7 til 10 dage.

Placering / lys:

Planten behøver en varm og halvskygget placering. Fra midt maj til start oktober kan den også placeres i det fri.

Gødning, vanding og pleje:

For en optimal vækst og en mangfoldig blomstring behøver Sovetræet en stor krukke eller potte. I det tilfælde kan Sovetræet allerede det første år nå en højde på 1,5 meter. Gennem flere beskæringer opnås en buskagtig, men graciøs vækst. Om sommeren vandes meget og bedst med daglige vandinger, men udgå at planten sopper i vand. Fra om foråret to indtil efteråret skal Sovetræet tilføres krukkeplante- eller universalgødning hver 2. uge.

Overvintring:

Ideelt er det med en lys overvintring på mellem 5° og 15° C. Vand forsat sporadisk. Ved varmere vinteropbevaring vokser Sovetræet videre og skal ved tør luft også overbruses af og til.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.