

Catharanthus

(*Catharanthus roseus* syn. *Vinca roseus*)

200 frø

Værd at vide:

Denne stedsegrønne og rosablomstrende *Catharanthus* vokser til lille busk med en højde på 30 til 80 cm. Den udvikler en rig forgrening samt kødfulde, ovale blade. Den overordentlig populære tropiske prydpante blomstre fra april til oktober. De smukke og store blomster på 3 til 4 cm viser sig talrigt. Planter af denne art og som dyrkes fra frø blomstre tydeligt mere.

Den tilhører de hundegiftige vækster. Giften sidder i rødderne og i det tilfælde uheldet er ude sker der ikke nogen alvorlig forgiftning. *Catharanthus*'en er også kendt som læge plante og dens stoffer anvendes til personer i kræftterapi. Da planten ikke er frostfast dyrkes den på vores breddegrader mest som etårig plante.

Oprindelse:

Catharanthus er hjemmehørende på Madagaskar. I vore dage findes den overalt i de tropiske områder samt Hawaii, hvor den også kaldes Kihapi.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene sættes i en dybde af 0,5 cm i fugtig såjord. Ved 22° til 25° C spirer frøet efter 2 til 6 uger. Ved en højde på 4 cm kan planten prikles (omplantes) til potter med en topdiameter på 10 cm.

Placering / lys:

Planten elsker lyse til halvskyggede placeringer.

Gødning, vanding og pleje:

Almindelig enhedsjord, regelmæssig vanding og jævn fugtighed samt tilførsel af krukkeplantegødning hver 14. dag er tilstrækkelig for en god, sund og hurtig vækst.

Overvintring:

I frostfrie zoner dyrkes *Catharanthus* som flerårig plante. Hos os dyrkes den overvejende som etårig plante da såning / formering lykkes let.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

