

Koyverplante

(*Solanum mammosum*)

10 frø

Værd at vide:

Denne flerårige, tropiske Natskyggevekst med dens eksotiske, mørkeblå blomster og de bizarre 3 til 5 cm lange gul-orange frugter, der vokser på lange træagtige stilke, regnes til Prydauberginerne. Ligesom med Ægge træet er frugterne ikke spiselige. Den forunderlige busk når en højde på 1,2 til 1,8 meter.

Planten selv ser mest af alt ud som en tomatplante, stilke og grene er besat med små torne. Frugterne, der nogen tid efter blomstringen modnes, er først hvidlig gulgrøn og skifter farve til lysende gul-orange. Deres sjove form minder om små koyvere, deraf også plantens navn. I pletter eller krukker er det en interessant og usædvanlig plante.

Oprindelse:

Den er hjemmehørende i Sydamerika og på de Canariske Øer.

Formering:

Såning / spiring er muligt hele året indendørs. Frøene sås, jævnt fordelt, på fugtig såjord og dækkes et tyndt lag af såjorden og trykkes let til. Ved jævn fugtighed og en temperatur på 20° til 24° C viser de første spirer sig efter 7 til 14 dage.

Placering / lys:

Koyverplanten foretrækker lyse og solrige placeringer.

Gødning og vanding:

Ved ca. 10 cm højde kan de unge planter deles og plantes enkeltvis i pletter med enhedsjord. Vand rigeligt, men undgå vedvarende våd jord, og for en kraftig vækst tildeles krukkeplantegødning hver 3. uge. Frugterne bliver ret længe på stilken og lader sig på fremragende vis anvende til vaser eller Ikebana arrangementer.

Overvintring:

For overvintring vælges et lyst og frostfrit rum. Vand kun lidt og foretag en mindre tilbageskæring.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

