

Sovetræ (gulblomstrende)

(Albizzia lebeck)

50 frø

Værd at vide:

Det statelige Sovetræ med sine behageligt duftende, grøngule til hvide blomster er den største af arterne i Albizzia familien. I naturen bliver den 18 til 30 meter høj. Stammen er glat og bladene er væsentlig større end ved andre Sovetræs arter og tillige dobbeltfjerede. Det tropiske træ er helligt for buddhister. Som en spøg gav man det også navnet "Kvindens tunge", fordi støjen fra frøene, der bevægede sig i bælgene, lød som en hvissen og tischen fra kvinder. Denne skønne plante er en herlig krukkeplante til sommerterrassen.

Oprindelse:

Planten er hjemmehørende i tropisk Sydasien.

Formering:

Det er anbefalelsesværdigt at slibe de hårdtskallede frø med sandpapir og derefter lægge dem i blød i rumvarmt vand i 24 timer. Fordel derefter frøene på fugtig såjord og dæk dem med et 1 cm tykt lag såjord. Ved jævn fugtighed spirer frøene efter 1 til 4 uger. Lad de små planter vokse i mindst 3 uger inden prikling/omplantning.

Placering / lys:

Det gulblomstrende Sovetræ elsker en varm og halvskygget til solrig placering.

Gødning, vanding og pleje:

God drænende enhedsjord er godt egnet som vækstmedie. På grund af den kraftige vækst skal man vælge en stor potte / krukke. Planten har behov for meget vand og vokser kraftigt. I de første 2 - 3 år kan man flere gange om året skære det en fjerdedel tilbage. Ved en kraftig forgrening er tilbageskæring kun nødvendig, hvis man synes planten er blevet for stor. Fra april til oktober gives krukkeplante- eller universalgødning hver 14. dag.

Overvintring:

Træet er ikke vinterfast og behøver en lys og ikke for varm plads. Undgå placering tæt på en varmekilde.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

