

Troldnød

(*Hamamelis virginiana* L.)

25 frø

Værd at vide:

Den fra Nordamerikas Atlanterhavs-kyst samt fra Østasien stammende Troldnød fortryller om efteråret og vinteren med dens bladløse fremtræden med små, gule, krølleagtige blomster. De behageligt duftende kronblade er lange og da blomstringstiden ligger om vinteren, viser frugterne sig først om sommeren. På dens naturlige voksesteder vokser den vinterhårdføre *Hamamelis* vildt. Hos os er det en kostbar og langsomt voksende Have- og Parkplante.

Troldnød kan dyrkes som et træ og bliver ca. 3 til 5 meter højt og vokser bredt og udfaldende. Bladene ligner dem fra Hasselnød. Som lægeplante og i særdeleshed i homøopati finder *Hamamelis virginiana* anvendelse.

Oprindelse:

Hamamelis er hjemmehørende i Nordamerika og Østasien.

Formering:

I naturen springer frøene nærmest eksplosionsagtig ud af frøkaplerne og lander op til flere meter væk. I hjemmet kan frøene med fordel lægges i blød natten over i rumvarmt vand. Efterfølgende sættes frøene i en dybde af 0,5 til 1 cm i løs og fugtig havejord eller fugtig såjord. Spiringen foregår ret uensartet over 2 til 8 uger.

Placering / lys:

Placeringen skal være solrig, halvskygge skader dog ikke planten, men det går ud over blomstringsvilligheden.

Gødning, vanding og pleje:

Da Troldnød vokser relativt langsomt (20 til 40 cm pr. år), kan den også i de første år dyrkes i en krukke. Den skal dyrkes solitært, altså enkeltvis og fritstående, idet forgreningen mere går i bredden end i højden. Derfor skal den også kun ganske undtagelsesvis ske en tilbageskæring. Efter efterårets løvfald sætter den smukke og lysende blomstringstid ind i løbet af vinteren der varer ved i perioden december til marts. Jorden skal være humusrig og løs.

Overvintring:

Planten er fuld vinterhårdfør og har ikke behov for vinterbeskyttelse.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

