

Granatæble

(*Punica granatum*)

25 frø

Værd at vide:

Granatæbletræet regnes til de ældste kulturplanter og også til de ældste krukkeplanter. Det galt som den største pryd, at eje et *Punica granatum*. Derfor findes der i dag stadig i Botaniske Haver eksemplarer der er langt over hundrede år. Det vokser opret og meget forgrenet. Blkiver i naturen 2 til 5 meter højt.

Bladene er lysende grønne og de særlige røde tragtformede blomster ses ofte i grupper af 3 til 5 på skudspidserne. Frugterne vil dog ikke her modnes, men alt i alt en smuk, længelevende og robust krukkeplante. Granat æblekerne finder mere og mere udbredelse i madlavningen på vores breddegrader og har været kendt til dette formål i Middelhavsområdet i umindelige tider.

Oprindelse:

Dets oprindelige hjemegn findes *Punica* i Persien, i vore dage findes det overalt i det Sydeuropæiske område.

Formering:

De hårde frø lægges i blød i rumvarmt vand natten over. Efterfølgende strøs de ud på fugtig såjord og trykkes let an. Ved en temperatur på mellem 20° og 25° C spirer frøene efter 2 til 4 uger.

Placering / lys:

Da træet næsten altid dyrkes i krukker bliver det typisk 1,8 til 2,0 meter højt skal der helst være meget lyst, hvor det placeres i boligen, men dog beskyttet mod brændende sol. Gennem sommeren er en placering i det fri naturligvis og ideelt en mulighed.

Gødning, vanding og pleje:

Kravene til jorden er beskedne. Som vokse medie er enhedsjord tilstrækkelig. Gennem vækstsæsonen skal træet vandes meget og hver 3. til hver 4. uge tildeles det krukkeplantegødning. Ved frugtudvikling er tildeling af gødning hver uge nødvendig. Træet er selvbestøvende og er tydeligere mere voksevilligt end dværghsorten (*Punica granatum nana*). Bladene er for det mest lysegrønne og smalle og de smukke røde blomster har en ret lang holdbarhed.

Overvintring:

Granatæbletræet bør overvintres på en kølig plads. En temperatur på 4° til 10° C er ideelt. Gennem denne fase smider træet løvet. Derfor skal der også vandes mindre. Tilbageskæring af tynde og tørre grene er altid fornuftigt. Overvintres træet varmt, forbliver træet grønt, vokser videre og har derfor behov for oftere vanding. Dog bliver træet ikke så blomsterrigt det følgende år.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

