

## Storblomstret Cylinderpudser

(*Callistemon rigidus*)

200 frø

### Værd at vide:

Denne Cylinderpudser er let at genkende på dens kompakte, stive form og dens særligt store, lange, lysende mørkerøde blomster. Den kan nå en højde af 2,5 meter, udvikler grønne til bronzefarvede 15 cm lange blade og regnes som en pasningslet plante. Ideelt er det med dyrkning af den i potter eller krukke da den ikke er vinterfast.

Planten stammer oprindeligt fra New South Wales i Australien og idag er den udbredt overalt i troperne samt Sydeuropa og beundres der som prydræ.

### Oprindelse:

Dens oprindelse skal findes i Australien: Queensland, New South Wales og Victoria.

### Formering:

Såning og spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Strø de ekstremt små frø ud på gennemfugtet såjord og dæk dem kun med et ganske tyndt lag af såjorden. Ved jævn fugtighed og varme spirer frøene efter 6 til 8 uger. I ungplantestadiet vokser frøplanterne meget langsomt.

### Placering / lys:

Callistemon elsker en lys og solrig placering.

### Gødning, vanding og pleje:

Planten trives i enhedsjord og har behov for meget vand. Bedst anvendes blødt, afkalket vand eller regnsvand da Cylinderpudseren er meget ømfindelig overfor kalk. Forsyn planten fra april til oktober med krukkeplantegødning ugentligt. En tilbageskæring efter blomstring fremmer den buskagtige vækst og den nye blomstring. Om sommeren skal man være opmærksom på, at jordklumpen hele tiden er fugtig, da udtørring kan foranledige betydelig skade på planten.

### Overvintring:

Om vinteren vandes mindre. Rodklumpen må dog heller ikke tørre ud i denne fase. Ideelt er en lys og kølig placering ved en temperatur på mellem 8° og 12° C.

### Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

