

## Amerikansk Sukkerahorn

(*Acer saccharum*)

25 frø

### Værd at vide:

Dette smukt forgrenede træ (på engelsk kaldet Sugar Marpel) med dets brede krone når en højde på 10 til 15 meter. De første 8 til 10 år dog meget langsomt voksende. Denne Ahorn er også elsket på grund af de flotte efterårsfarver, der kan gå fra gule til orange og til dyb røde. Disse flotte farver ses dog kun på lettere sure jorde.

I over 100 år har man udvundet sukkersaft af denne Sukkerahorn. Den bliver i den sene vinter snittet så saften klan løbe ud og blive opsamlet. Af denne Ahornsafte fremstilles den elskede Ahornsirup. Saften kan også anvendes til sukkerfremstilling. Pr. træ tappes 60 til 150 liter saft og dette svarer til 15 til 30 kilo sukker. Træet er holdbart og anvendes også til møbler eller boligindretning.

I haven vil den Amerikanske Sukkerahorn føle sig godt tilpas på en lys til solrig placering i en god næringsstofrig, let fugtig, men godt drænende jord.

### Oprindelse:

*Acer saccharum* er hjemmehørende på hele USA's østkyst op til Canada. Enkelt eksemplarer kan også findes i Florida.

### Formering:

Såfremt "vingerne" forsat sidder på frøet kan de blot skæres af. Frøene fra Ahorn regnes til frostspirer og derfor skal de stratificeres før såning. Det betyder de skal have en længere kuldperiode. Enten kan frøene lægges i ens skål med sand og stilles udendørs i 2 - 3 måneder om vinteren eller de kan lægges i køleskabet i 5 til 7 dage. Fra såning til begyndende spiring går der 8 til 12 uger.

### Placering / lys:

Allerede fra ungplante stadiet foretrækker træet lyse til solrige placeringer.

### Gødning, vanding og pleje:

Ideelt er det med en let fugtig jord, men dog godt drænende. Ved en højere sphagnumandel (altså sur jord) træder de smukke efterårsfarve endnu mere tydeligt frem.

### Overvintring:

Selv ungplanter er vinterhårdførere. De bør dog beskyttes mod afgrævning af dyr. Træet smider løvet om efteråret.

### Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

