

Amerikansk Febertræ

(*Sassafras albidum*)

20 frø

Værd at vide:

Det hos os sjældent forekommende Febertræ, der også kendes som Fennikeltræ eller Nillikekaneltræ, regnes for et af de skønneste træer i skovene på nordamerikas østkyst. Det løvfældende træ tilhører den lille slægt af laurbærtræer, det har duftende ved og begæres på grund af dets usædvanlige blade. Det bliver op til 10 meter højt og dets blade er oftest tre fligede og minder om figenblade. Der kan på et træ forekomme op til tre forskellige bladformer. Om efteråret forvandles de sommergrønne blade til lysende orange-røde blade. Det Amerikansk Febertræ henregnes til de planter der er stærkest involveret i fænomenet "Indian Summer" - det fænomen mange har set på billeder fra Amerika med skovbryn/træer i deres fulde efterårspragt af grønne, brune, røde og gyldne nuancer.

Oprindelse:

Det usædvanligt smukke træ har sin oprindelse på den nordamerikanske østkyst.

Formering:

For en hurtigere spiring kan frøene stratificeres. Læg blot frøene uden plastikpose i en såbakke med sand og stil dette i f.eks. køleskabets fryserum i nogle dage. Derefter fordeles frøene på fugtig såjord eller sandholdig jord og dæk frøene med 1 cm af det samme dyrkningsmedie. Afslutningsvis trykkes såjorden let til og holdes let fugtig frem til begyndende spiring. Ved 10° til 18° C følger spiringen efter 2 til 8 uger. Der vil ofte forekomme "efternølere".

Placering / lys:

Den sommergrønne Amerikanske Febertræ kan godt lide en lys og solrige placering.

Gødning, vanding og pleje:

Træet medregnes til de pælerodede og trives bedst i godt drænende sur jord. Det kræver meget lidt vand og er generelt nøjsomt.

Overvintring:

I de første år er en vinterbeskyttelse anbefalelsesværdig. Senere er det Amerikanske Febertræ tilstrækkelig vinterhårdt.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

