

Kamfertræ

(*Cinnamomum camphora* syn. *Laurus camphora*)

20 frø

Værd at vide:

Dette imponerende, stedsegrønne træ fra Laurbærtræernes familie stammer fra Asien. Nærmere bestemt Taiwan, Kina og Japan. Det blev bragt til Europa i det 17. århundrede og findes idag først og fremmest i Middelhavsområdet. Kamfertræet bliver udpræget gammelt og fra dets ved udvindes den aromatisk-duftende kamferolie. Denne anvendes i saunaer, virker afspændende og sørger for en god luft. Idag kan denne olie fremstilles syntetisk.

Bladene er glatte, let læderagtige, lancetformede og ved afbrækning frigives dens velduft. Selv om træet er meget lidt fordringsfuldt, har en stor tilpasningsevne, pasningslet og længelevende har det endnu ikke rigtigt slået igennem som krukkeplante.

Oprindelse:

Denne laurbærvækst er hjemmehørende i Kina og Japan.

Formering:

Frøene lægges i blød natten over i rumvarmt vand. Derefter sættes frøene i en dybde af ca. 1 cm i fugtig såjord. Hold en afstand mellem frøene på ca. 6 cm. Frem til spiring holdes en jævn fugtighed. Såbakken placeres mørkt frem til begyndende spiring. Spiringen varer undertiden et par uger.

Placering / lys:

Kamfertræet elsker placeringer i halv sol til fuld sol. På mørke placeringer mister bladene snart deres kraftige grønne farve og bliver gule.

Gødning, vanding og pleje:

Træet skal have en fugtig, næringsstofrig og gerne lidt leret jord at vokse i. På grund af dets mange blade har det brug for masser af vand om sommeren. I vækstsæsonen bør der gødes en gang om ugen fra slutning af marts til oktober. Til det brug anvendes en universalgødning eller en flydende krukkeplantegødning. Vokser det for kraftigt kan det beskæres kraftigt efter endt blomstring.

Overvintring:

Da planten er stedsegrøn kræver den også om vinteren en lys placering. Ideelt er det med en temperatur på 6° til 15° C. Frost skal helst ikke forekomme. En vinterhave eller væksthuse med en smule opvarmning er også en mulighed for en helårs placering. I vinterhalvåret er vandbehovet meget lille.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

