

Musling Ingefær

(*Alpinia zerumbet* syn. *Alpinia nutans*)

5 frø

Værd at vide:

Den sjældne plante regnes til en af de smukkeste prydingefær arter. Det er en udpræget robust plante. Dyrkes Musling Ingefæren i krukker vil den være særligt iøjenfaldende.

Om sommeren udvikler den nedhængende, duftende blomsterranker, hvor de 3 yderste blomster dækblade vokser som muslingeskaller. På grund af dens blomsterfarve kaldes den i engestående lande også for "Pink Porcelain Lily".

Bladene er smalle og lysende grønne. I naturen når denne Ingefær en højde på op til 3 meter. Ved krukke dyrkning bliver den typisk 1,5 til 2 meter.

Alpinia zerumbet udvikler flittigt rhizomer, de spreder sig let ud og bliver til tykke rodklumper.

Oprindelse:

Den smukke Muslinge Ingefær kommer fra øerne i Stillehavs regionen.

Formering:

Frøene har behov for forbehandling og skal først overhældes med meget varmt vand (derved aktiveres spiringsprocessen). Herefter læges de i blød i rumvarmt vand natten over og efterfølgende sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved jævn fugtighed og en temperatur på mellem 22° og 25° C lykkes spiringen efter 2 til 3 uger.

Placering / lys:

Ideelt er det med en halvskygget til solrig placering.

Gødning, vanding og pleje:

Pasning af denne stedsegrønne plante er ret let, dog bryder den sig ikke om kolde temperaturer. Jorden skal være næringsstofrig og godt drænende. Tilføj altid gerne noget sand til jordblandingen. I de varme sommermåneder er vandbehovet højt og om vinteren skal den holdes ret tør. I vækstsæsonen tilføres krukkeplantegødning eller universal gødning hver 4. uge.

Overvintring:

Den må ikke overvintres ved en temperatur på under 10° C. Pas på ikke at overvande om vinteren.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

