

Hvid Kinesisk Blåregn

(*Wisteria sinensis alba*)

4 frø

Værd at vide:

Den hvide, vinterhårdføre Blåregn er en dejlig kontrast til de rosa og violet-blå blomstrende sorter. Den er hurtigtvoksende og dertil den mest vokse villige af alle Blåregn. Den kraftige klatre- og slyngplante egner sig godt som beplantning ved carporte, murer, havehegn eller pergolaer.

Den løvfældende plante udvikler lysegrønne, fjerede blade og 30 til 50 cm lange duftende, nedhængende blomsterranker. Blomstringstiden går fra april til midt juni.

Oprindelse:

Denne blåregn stammer fra Asien.

Formering:

For hurtigere spiring kan de store, flade frø slibes let med sandpapir og derefter lægges i blød i rumvarmt vand i 12 timer. Efterfølgende sættes frøene fast i fugtig såjord med en afstand på 5 cm og dækkes med 1 cm af såjorden og såbedet trykkes let fast. Ved jævn fugtighed og varme spirer frøene efter 2 til 8 uger.

Placering / lys:

Wisteria elsker solrige placeringer, men den trives også i halvskygge. Allerede som ungplante skal den have et espalier eller tilsvarende klatre hjælp.

Gødning, vanding og pleje:

Jorden skal være humus- og næringsstofrig. For at få en rig blomstring skal den studses hyppigt og man kan også roligt beskære den kraftigt. Tilbageskæringen kan være op til en 1/3 af den samlede højde eller brede. Der går nogle år inden begyndende blomstring, men når det kommer sker det i allerede i april og før løvspring.

Overvintring:

Blåregnen er vinterhårdfør og behøver ikke vinterbeskyttelse. Den kan om nødvendigt skæres tilbage inden vinteren.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

