

Japansk Blodgræs

(*Imperata cylindrica* "Red Baron")

50 frø

Værd at vide:

Japansk Blodgræs er en dværggræs, der kan dyrkes såvel alene i krukker, i staudebedet eller som kontrast til bambus og som med dens røde farve falder en i øjenene med det samme.

Den fordringsløse plante udvikler nye strå og blade der bliver røde i løbet af juli og forbliver lysende røde indtil vinteren sætter ind.

Oprindelse:

Imperata har sin oprindelse i Japan.

Formering:

Tryk de godt fordelte frø fast på fugtig såjord. Spiringsprocenten kan hæves meget ved iblanding af 25% perlite i såjorden. Dette naturprodukt opmagasinere vand såvel som varme og samtidigt bevirker det en luftig jord. Ved en temperatur på 20° til 25° C og en jævn fugtighed spirer frøene efter 10 til 12 dage.

Placering / lys:

Denne dværggræs elsker meget lyse til fuld sol placeringer. Jo mere sol jo kraftigere rødfarvning.

Gødning, vanding og pleje:

For at den kan danne en løs, strittende vækst er en næringsstofrig jord ideel. Er jorden for svær kan den iblandes sand eller småsten. Som gødning anvendes bedst organisk gødning eller færdige græs eller bambus gødninger. Ældre strå i planten kan til enhver tid fjernes ved bortskæring.

Overvintring:

En tilbageskæring skal først foretage om foråret. De indtørrede blade yder vinterbeskyttelse og ved mange arter fører en afskæring om efteråret til plantens død. Særligt om vinteren, når der er sne, er græsserne de rene skønheder. Pampasgræs er ømfindelig over for våd jord om vinteren. Den Japanske Blodgræs dækkes ganske enkelt med nedfaldet løv om vinteren og om foråret skæres den af ved jordoverfladen, hvorefter den skyder på ny.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

Værd at vide om græsser og bambus:

Græsser hører med deres 13.000 arter til den 3. største plantefamilie. De stammer fra overalt på kloden og medregnes til stauderne. Bambus omfatter 1.500 arter og medregnes også til græsserne, forskellen er blot at deres strå bliver træagtige og har en holdbarhed på mange år. Alle disse planter besidder en høj prydværdi. De bliver vindbestøvet og mange af græsserne bliver formeret via udsæd.

