

Bonsai - Pudderkvasttræ

(*Calliandra haematocephala*) (indendørs bonsai)

10 frø

Ved formering af bonsai ligger den store chance deri, at man fra starten kan påvirke form og facon på træet. Det varer ganske vist længere at få et træ, når man starter med et frø. Til gengæld får man et tættere træ, når man lader det vokse til i en bonsaiskål end, hvis man tog træet i en skov.

Værd at vide:

Pudderkvasttræet har ovale fjerblade og lysende røde, kuglelignende blomster, der ud fra deres form minder om en pudderkvast eller en sminkepensel. Blomsterne viser sig nælsten hele året, men talrigst om efteråret.

Oprindelse:

Pudderkvasttræets hjemegn er det tropiske og subtropiske Amerika.

Formering:

Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød i rumvarmt vand i nogle timer. Efterfølgende fordeles frøene på fugtig såjord og de dækkes kun ganske let med såjord. Ved en temperatur på mellem 20° og 25° C spirer de første frø efter 10 til 14 dage.

Placering / lys:

Calliandra skal placeres lyst til fuld sol. Udendørs er det kun nødvendigt med beskyttelse mod den om højsommeren brændende middagssol.

Gødning og vanding:

Om sommeren holdes den jævnt fugtig og om vinteren (ved en temperatur på 10° til 15°) vandes mindre. I vækstsæsonen fra april til oktober skal *Calliandra* tilføres flydende bonsai-gødning hver 20. dag.

Beskæring:

Efter de nye skud har udviklet 5 til 6 bladpar skal den skæres tilbage til 1 til 2 blade. Grene kan skæres af fra maj til august.

Jord:

Brug ved ompotning og efter formeringen et miks af henholdsvis 1/2 enhedsjord, 1/4 sphagnum og 1/4 sand.

