

Bonsai - Japansk Sortfyr

(*Pinus thunbergii*) (udendørs bonsai)

30 frø

Ved formering af bonsai ligger den store chance deri, at man fra starten kan påvirke form og facon på træet. Det varer ganske vist længere at få et træ, når man starter med et frø. Til gengæld får man et tættere træ, når man lader det vokse til i en bonsaiskål end, hvis man tog træet i en skov.

Værd at vide:

Den Japanske Sortfyr hører i Japan til den foretrukne bonsaiart. På grund af dens modstandsdygtighed og dens robuste ydre er den meget skattet. Den pynter også i mange haver og parker.

Også som bonsai kan den overleve godt på stenede og golde jorde. Den Japanske Sortfyr bliver som bonsai mest formet i den stilarten Literal, hvor der ses meget af stammen. Med undtagelse af ganske få kan alle stilarter dog anvendes.

Oprindelse:

Pinus thunbergii er hjemmehørende i Japan.

Formering:

Denne art tilhører koldtspirerne og derfor behøver dens frø frost for at kunne nedbryde spirerhæmmererne i frøet. Læg frøene i en skål med sand og stil denne i en fryseboks i en uge. Derefter sættes frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord eller sandholdig jord frem til spiring holdes jorden jævnt fugtig og såbakken stilles køligt. Til begyndende spiring går der 3 til 10 uger. 2 måneder efter spiring kan de små planter deles og prikles om.

Placering / lys:

Den Japanske Sortfyr foretrækker lyse til solrige placeringer.

Gødning og vanding:

Det lille træ behøver kun lidt vand. Vand kun når jorden er næsten tørret helt op. Fra marts til oktober tilføres flydende bonsai-gødning hver 3. uge.

Beskæring:

Gennem vækstfasen afplukkes for lange skud og de nye lys på de mindre skud afkortes med 1/3 del. Ca. hvert 2. år skæres grenspidserne lidt tilbage. Ved det begyndende efterår fjernes gamle nåle og overflødige grene.

Jord:

Stenrige og sandholdige jorde såvel som færdige bonsaijorde til udendørsbonsai er egnede dyrkningsmedier. Jorden skal i hvertfald være godt drænende.

