

Bonsai - Japansk Rødfyr

(*Pinus densiflora*) (udendørs bonsai)

40 frø

Ved formering af bonsai ligger den store chance deri, at man fra starten kan påvirke form og facon på træet. Det varer ganske vist længere at få et træ, når man starter med et frø. Til gengæld får man et tættere træ, når man lader det vokse til i en bonsaiskål end, hvis man tog træet i en skov.

Værd at vide:

Den Japanske Rødfyr er eventyrlig smuk og en meget iøjenfaldende fyr, der vokser langsomt og udvikler en skærmformet krone. Japanerne kalder den Tanyosho-Pine og de skaber excelente bonsaiformer ud af dette træ.

Nålene er mellem til mættede grønne og faste. Den udvikler mange små kogler der ofte sidder i klynger. Japansk Rødfyr tåler vind, tørke og kulde ned til -20° C. Ved for kraftig vanding bliver nålene gule.

Oprindelse:

Pinus densiflora er hjemmehørende i Japan.

Formering:

Denne art tilhører koldspirerne og behøver derfor frost for at nedbryde de spirehæmmende stoffer i frøet. Læg derfor frøene i skål med sand som stilles i en fryser i en uge. Efterfølgende sættes frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord eller sandholdig jord. Såbakken sættes herefter køligt og holdes jævnt fugtig. Til begyndende spiring går der 3 til 10 uger. 2 måneder efter spiring skal de små frøplanter prikles (omplantes).

Placering / lys:

Japansk Rødfyr foretrække lyse til solrige placeringer.

Gødning og vanding:

Det lille træ behøver kun lidt vand. Vand kun når jorden er næsten tørret helt op. Fra marts til oktober tilføres flydende bonsai-gødning hver 3. uge.

Beskæring:

Gennem vækstfasen afplukkes for lange skud og de nye lys på de mindre skud afkortes med 1/3 del. Ca. hvert 2. år skæres grenspidserne lidt tilbage. Ved det begyndende efterår fjernes gamle nåle og overflødige grene.

Jord:

Stenrige og sandholdige jorde såvel som færdige bonsaijorde til udendørsbonsai er egnede dyrkningsmedier. Jorden skal i hvertfald være godt drænende.

