

Kaktus - Guldkugle

(Echinocactus grusonii)

50 frø

Kaktussernes vidunderlige verden består udelukkende af sukkulenter i mange usædvanlige former og synlig blomstermangfoldighed. Gennem deres legendariske beskedenhed er de overlevelseskunstnere i enhver vindueskarm. Spiringen lykkes let og hurtigt (5 dage til 5 uger).

Værd at vide:

Den kuglerunde, dyrkningsnemme kaktus er nok den kendeste af alle kaktus. De gule torne er ovenud stærke og en forkert berøring kan være meget smertefuld.

Den kendes også i visse egne som "svigermors stol".

Oprindelse:

Echinocactus har sin oprindelse i Mexico.

Formering:

Såning/spiring er muligt indendørs hele året. Bland sigtet såjord med ca. 25% fint sand (bedst med kvartssand). For at frøene ikke skal falde ned gennem jorden må denne ikke være for grov. Fugt jorden med en vandforstøver (regnvand) og strø herefter frøene jævnt fordelt ud over såjorden. Alle kaktus er let spirende og skal derfor ikke dækkes. Afgørende er tilstrækkelig varme (16° til 25° C) og en høj luftfugtighed. Derfor skal hver såbakke/-skål dækkes med folie og hver 2. til 3. dag skal folien fjernes i 2 timer for at få en god beluftning.

Jord:

Efter et år er det muligt at omplante kaktussen til den i handlen forekommende kaktusjord.

Placering / lys:

Alle solrige pladser er ideelle for kuglekaktussen. I sommermånederne vil den også føle sig godt tilpas i det fri blot den beskyttes mod regn.

Gødning, vanding og pleje:

På grund af denne kaktus ømfindtlighed overfor vand, skal den vandes fra neden (dog undtaget vanding inden tilførsel af gødning, se herunder). Der skal kun vandes når jorden er udtørret. Unge planter skal generelt holdes lidt fugtigere end ældre planter. Som vandingsvand bruges afkalket vand eller bedst regnvand. Overskydende vand fjernes for at undgå våd jord og at rødderne rådner.

Tip: På varme / tørre placeringer overbruses kaktussen med en forstøver fra oven hver 2. uge.

Gennem vækstsæsonen gødes hver 3. til hver 4. uge med flydende kaktusgødning. Gød kun når jorden er fugtig, så rødderne ikke "brændes af".

Overvintring:

Om vinteren er såvel en varm plads ved 15° til 20° C som en kølig placering ved 5° C velegnet. Vand kun ganske sjældent.

