

Bjerg Mammut

(*Sequoiadendron gigantea*)

50 frø

Værd at vide:

Bjerg Mammuten er jordens største levende væsen. Volumemæssigt er det større end blåhvalen. Bjerg Mammuten eksisterede før istiden og er dermed også ældre end Rocky Mountains. Kapslerne med Bjerg Mammut frøene frigives først efter stor varme påvirkning. I Sequoia National Park i Californien finder man det ca. 2.500 år gamle og levende Mammut-træ "General Sherman".

Oprindelse:

Træet er før alt andet hjemmehørende i Syd Californien.

Formering:

Såning og spiring er muligt hele året indendørs. Læg først frøene i køleskab ved 6° til 8° C i 8 til 10 dage. Derefter lægges frøene i blød i rumvarmt vand i 1 til 2 dage. Herefter trykkes frøene let i fugtig såjord. Da det drejer sig om en let spirende plante skal frøene ikke dækkes. Spiringstiden strækker sig over 4 til 7 uger.

Placering / lys:

Som unglante indtil det 3. leveår skal Mammuten holdes i en potte. Ved udplantning i haven skal den det første vinterbeskyttes ved afdækning nederst med f.eks. løv og kviste. Træet kan også holdes som potteplante henholdsvis Bonsai kultur, hvad der naturligvis begrænser den fremtidige vækst betragteligt.

Gødning, vanding og pleje:

Træet har brug for en fugtig og næringsstofrig jord. En mulighed er også sandholdig lerjord. Vand træet som unglante henholdsvis potteplante regelmæssigt. Bedst er det med ugentlige vandinger. Om vinteren bør den ikke stå i nærheden af radiatorer på grund af den meget tørre luft.

Overvintring:

Fra det 3. år er Bjerg Mammuten absolut vinterhårdfør.

Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

