

## Australsk Djævlehoved (Papegøjenæb)

(*Clianthus formosus* syn. *Swaisonia formosa*)

20 frø

### Værd at vide:

Denne stedsegrønne, krybende eller klatrende *Clianthus* hører med til de absolut smukkeste blomster på denne jord. Der findes kun 2 arter af denne plante, der udmærker sig ved sine lange grene og ganske store næblignende blomster. De glinser med et ildrødt lakagtigt skær og på den nederste del af de opretstående blomsterblade er der en sort plet.

### Oprindelse:

*Clianthus* stammer fra Australien fra nord- og vestkysten over til de østlige bjerge.

### Formering:

Såning og spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene skal slibes med sandpapir. Så bliver skallen tyndere og derved kan de lettere suge vand. Efter slibning lægges frøene i blød i 24 timer i rumvarmt vand. Derefter trykkes frøene ned i fugtig såjord i en dybde af 1 cm. Stil såbakken varmt og hold jorden jævnt fugtig. Spiringen følger efter ca. 2 til 6 uger.

### Placering / lys:

En lys og solrig placering er en forudsætning for en god vækst og en rig blomsterudvikling. Varme er også noget *Clianthus* elsker. Derfor før potten/krukken med Djævlehoved planten ikke stilles ud i det fri før tidligst i juni. Senest start oktober bør den tages ind igen. Desforuden bør den placeres på en vindbeskyttet plads.

### Gødning, vanding og pleje:

Den smukke *Clianthus* har behov for en smule opmærksomhed, da den er meget ømfindelig over for våd jord. Vand derfor sparsomt. Fra maj til oktober gives krukkeplantegødning hver 14. dag. En beskæring en gang om året er passende og bør begrænses til enkelte af de ældste grene.

### Overvintring:

Planten skal overvintres i et lyst rum. I mørke rum kan den dø, da dens behov for lys er meget stort. En temperatur på mellem 5° og 12°C er tilstrækkeligt. Vanding skal foretages med lange intervaller mellem de enkelte vandinger.

### Vigtige dyrkningstips:

Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen (ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

